

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

КОРДИАМИН

Регистрационный номер: 003713/01

Торговое название препарата: Кордиамин

Международное непатентованное название (МНН): никетамид

Химическое название: N,N-диэтилпиридин-3-карбоксамид

Лекарственная форма: раствор для инъекций

Описание: прозрачная, бесцветная или слегка окрашенная жидкость со своеобразным запахом.

Состав: диэтиламида кислоты никотиновой в пересчете на 100% - 250 г вода для инъекций - до 1 л Фармакотерапевтическая группа: аналеггтическое средство КодАТХ: [R07AB02]

Фармакологическое действие

Фармакодинамика: Обладает аналептическим действием. Стимулирует центральную нервную систему: оказывает возбуждающее действие на сосудодвигательный центр продолговатого мозга (особенно, при угнетении этого центра), что приводит к опосредованному повышению системного артериального давления. Возбуждает дыхательный центр за счет стимулирующего влияния на хеморецепторы синокаротидной рефлексогенной зоны, что приводит к увеличению частоты и глубины дыхательных движений. Препарат не обладает прямым стимулирующим действием на сердце и прямым стимулирующим сосудосуживающим эффектом.

Фармакокинетика: Хорошо всасывается при любом пути введения. Подвергается быстрой биотрансформации в печени с образованием неактивных метаболитов, экскретирующихся, в основном, почками.

Показания к применению

Коллапс, шоковые состояния при хирургических операциях и в послеоперационном периоде, нарушения сердечной деятельности, снижение тонуса сосудов, ослабление дыхания при инфекционных болезнях и в период выздоровления, асфиксия новорожденных, отравление наркотическими, снотворными и анальгетическими средствами.

Противопоказания

Гиперчувствительность, эпилепсия, приступы тонико-клонических судорог в анамнезе, гипертермия у детей, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Взрослым вводят подкожно, внутримышечно и внутривенно в дозе 1-2 мл 1-3 раза в сутки; детям - подкожно, в зависимости от возраста, в дозе 0,1 - 0,75 мл. Внутривенное введение осуществляют медленно.

При интоксикации наркотиками, анальгетиками, снотворными взрослым внутривенно (можно подкожно или внутримышечно) вводят 3-5 мл препарата.

Поскольку подкожные и внутримышечные инъекции кордиамина болезненны, для уменьшения боли в зависимости от ситуации в место инъекции предварительно вводят новокаин (1мл 0,5% раствора).

Высшие дозы для взрослых подкожно: разовая - 2 мл, суточная - 6 мл. Высшая разовая доза для подкожного и внутривенного введения при отравлении наркотиками составляет 5 мл.

Побочное действие

Беспокойство, тревожность, мышечные подергивания (начинающиеся с круговых мышц рта), тонико-клонические судороги, аллергические реакции, зуд кожных покровов, гиперемия лица, рвота, нарушение сердечного ритма, инфильтрация и болезненность в месте введения.

Передозировка Тонико-клонические судороги.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Судорожное действие Кордиамина усиливает резерпин, возбуждающий эффект относительно дыхательного центра устраняется средствами для наркоза, действие препарата ослабляют ПАСК и салюзид, к ослаблению аналептического эффекта и судорожного влияния приводят аминазин и другие производные фенотиазина.

Усиливает эффекты психостимуляторов и антидепрессантов. Снижает действие наркотических анальгетиков, снотворных, нейролептиков, транквилизаторов, противосудорожных средств.

Форма выпуска: Раствор для инъекций *2jrf0*. В ампулах по 2 мл, 10 ампул с инструкцией по применению в картонную коробку. Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения: В защищенном от света при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек: по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия.

105005, г. Москва, ул. Почтовая М., дом 2/2, строение 1, пом I ком. 2.

Производитель

АО «Биохимик», Россия.

Юридический адрес: Россия, Республика Мордовия, 430030, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15 А.

Адрес места производства: Россия, Республика Мордовия, 430030, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15 А.

Телефон: (8342) 38-03-68

E-mail: biohimic@biohimic.ru, www.biohimik.ru

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия.

129090, г. Москва, пр-т Мира, д. 13, стр. 1.

Тел.: 8-800-777-86-04 (бесплатно), 8(495)640-25-28

E-mail: reception@promo-med.ru